

Physidia S³ kotidialyysivaihtoehtona



Kotihemodialyysia Physidia S³-laitteella

Physidia S³ on mobiili hemodialyysilaitte kotikäyttöön. Se on helppokäyttöinen, turvallinen ja tehokas.

Physidia S³ laitteella hoitoajat ovat lyhyitä. Keskimääräiset hoito-ohjelmat kestävät 2–3 tuntia, 4–6 kertaa viikossa.

Physidia S³ on helppokäyttöinen

Physidia S³ laite on vuorovaikutteinen. Laite on kehitetty ajatellen käyttäjän mukavuutta. Laitteen tabletti ohjaa selkein ohjetekstein ja -kuvin jokaisessa dialyysin vaiheissa.

Physidia S³ ei vaadi vettä, koska dialyysineste on valmiina 5 litran pusseissa. Kotiisi ei tarvitse tehdä muutostöitä, laite vaatii ainoastaan maadoitetun pistorasian.

Hoito Physidia S³:lla on joustavaa

Itsenäinen kotihoito Physidia S³:lla tuo vapauden valita hoitoaika omaan aikatauluun sopivaksi.

Physidia S³ on helposti siirrettävä, voit ottaa laitteen mukaasi milloin ja minne haluat.

Physidia S³ painaa noin 24 kg.

Physidia S³ lisää elämänlaatua

Kotihoidon valinnassa on monia etuja. Pystyt hallitsemaan omaa aikaasi ja elää elämääsi omin ehdoin.

Elämänlaatu on subjektiivisesti koettu tunne, joka syntyy fyysisestä, psyykkisestä ja henkisestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnistamme.

Tutkimukset osoittavat, että kotihoitoja tekevät kokevat elämänlaatunsa korkeammaksi.

Lyhyillä toistuvilla Physidia S³ kotihoidoilla useammat ihmiset kokevat olonsa energisemmiksi ja hyvinvoiviksi, mikä auttaa paremmin selviytymään elämän eri asioista ja lisää tätä kautta elämänlaatua.

Kotihemodialyysi antaa paremmat mahdollisuudet palata töihin tai suorittaa opinnot loppuun. Saat enemmän aikaa sekä voimia jatkaa vapaa-ajan harrastuksiasi ja viettää aikaasi perheen ja ystävien parissa.

Kiinnostuitko Physidia S³ laitteesta?

Kysy lisätietoja sinua hoitavalta taholta

Munuaispoliklinikka: _____

Dialyysiosasto: _____



Nordic Medcomin kotidialyysitiimi on tukenasi,
yhteystiedot saat hoitavalta yksiköltäsi.

Viitteet:

Volume control and blood pressure management in patients undergoing quotidian hemodialysis. G. Nesrallah et al, Am. J. Kidney Dis. 2003, Jul; 42 (1 Suppl): 13–7.

Effect of Frequent or Extended Hemodialysis on Cardiovascular Parameters: A Meta-analysis P. Susantitaphong et al, J Kidney Dis. 2012, May; 59 (5): 689–699

In-Center Hemodialysis Six Times per Week versus Three Times per Week, G. M. Chertow et al, N Engl J Med 2010; 363: 2287–300

Determinants of Left Ventricular Mass in Patients on Hemodialysis: The Frequent Hemodialysis Network (FHN) Trials, C.T. Chan et al, Circ Cardiovasc Imaging. 2012, March 1; 5 (2): 251–261

The role of daily dialysis in the control of hyperphosphatemia, G. Steven et al, Kidney International, 2005, Vol. 67, Supplement 95, pp. S28–S32

Short daily hemodialysis is associated with lower plasma FGF23 levels when compared with conventional hemodialysis, J. Zaritsky et al, Nephrol Dial Transplant. 2014, 29: 437–441

Patients receiving frequent hemodialysis have better health-related quality of life compared to patients receiving conventional hemodialysis, A. X. Garg et al, Kidney International. 2017, 91, 746–754